

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

о проведении вакцинации против
COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак»

ЦЕНТРАВИАМЕД

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Лицензия № ЛО-16-01-008467 от 16.12.2020

Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье - наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ

ФИО вакцинированного:

Компонент I

Доза: 0,5 мл. Внутримышечно.

Дата проведения: _____

Компонент II. Вводится на 21 день

Доза: 0,5 мл. Внутримышечно.

Дата проведения: _____

В течение 30 минут после вакцинации просим Вас оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.

Вакцинации подлежат лица, не имеющие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.

Перед проведением вакцинации необходим обязательный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых врач-специалист определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ

После проведения вакцинации в 1-2ые сутки могут развиваться и разрешаются в течение 3 последующих дней кратковременные

ОБЩИЕ СИМПТОМЫ: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью;

МЕСТНЫЕ СИМПТОМЫ: болезненность в месте инъекции, гиперемия, отёчность.

Реже отмечаются: тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда - увеличение регионарных лимфоузлов. Возможно развитие аллергических реакций.

ВАЖНО! Иммунитет полностью формируется после второй дозы вакцины.

До этого времени человек еще не окончательно защищен, поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики: носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В течение 3-х дней после вакцинации:



не мочить место инъекции



не посещать сауну, баню



не принимать алкоголь



избегать чрезмерных физических нагрузок

При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства.

При повышении температуры тела после вакцинации принять нестероидные противовоспалительные средства.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА