

# ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

о проведении вакцинации против  
COVID-19 вакциной «Спутник Лайт»

**ЦЕНТРАВИАМЕД**

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Лицензия № ЛО-16-01-008467 от 16.12.2020

Уважаемый пациент!

Ваше крепкое здоровье - наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:

## СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННОЙ ВАКЦИНАЦИИ

### ФИО вакцинированного:

Доза: 0,5 мл. Внутримышечно.

Дата проведения: \_\_\_\_\_

В течение 30 минут после вакцинации необходимо оставаться в медицинской организации для наблюдения.

## ВАКЦИНАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА ОТ 18 ЛЕТ

### Перед проведением вакцинации:

- необходимо заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации и анкету;
- необходим обязательный осмотр врача для решения вопроса о допуске к вакцинации от COVID-19.

**Врач расскажет Вам** о возможных реакциях на вакцинацию

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

### ПОСТОЯННЫЕ:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

### ВРЕМЕННЫЕ:

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;
- при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.

## ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ

После проведения вакцинации может появиться реакция на вакцину, которая может проявляться

**ОБЩИМИ СИМПТОМАМИ:** озноб, повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, головная боль, слабость;

**МЕСТНЫМИ СИМПТОМАМИ:** болезненность, покраснение и зуд кожи, отечность в месте инъекции;

**РЕЖЕ ОТМЕЧАЮТСЯ:** головокружения, увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### В течение 3-х дней после вакцинации:



не мочить место инъекции



не посещать сауну, баню



не принимать алкоголь



избегать чрезмерных физических нагрузок

**При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации** принять антигистаминные средства (супрастин, тавегил, кестин, эриус и др.).

**При повышении температуры тела после вакцинации** принять нестероидные противовоспалительные средства (парацетамол).

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА