



Сезонная профилактика от гриппа

Вакцинация — самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений

- Вакцинация проводится ежегодно в осенний период, начало вакцинации: конец августа - начало сентября
- Вакцина формирует высокий специфический иммунитет против гриппа А и В
- Антитела после вакцинации появляются через 8-12 дней
- Иммунитет сохраняется до 12 месяцев
- Перед проведением вакцинации обязателен осмотр врача с проведением термометрии
- Вакцину вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча (в дельтовидную мышцу)

Вакцина Ультрикс-Квадри

Вакцина последнего поколения «Ультрикс-Квадри» произведена в России и является наиболее эффективным препаратом в борьбе с вирусами гриппа, что подтверждают проведенные клинические исследования.

- Вакцина разработана в соответствии с рекомендациями ВОЗ и содержит антигены вируса гриппа, индуцирующие выработку защитных антител
- Вакцина прошла государственную сертификацию и полностью безопасна



Вакцина Ультрикс-Квадри

- Вакцина представляет собой смесь протективных поверхностных и внутренних антигенов вирусов гриппа типа А (подтипы А (H1N1) и А (H3N2)) и типа В (линии Yamagata и линии Victoria) в фосфатно-солевом буферном растворе
- Антигенный состав вакцины изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией и рекомендациями ВОЗ

Показания к вакцинации Ультрикс-Квадри

Активная ежегодная профилактическая иммунизация против сезонного гриппа детей с 6 месяцев и взрослых без возрастных ограничений.

Вакцинация особенно показана:

1. Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений в случае заболевания гриппом:

- часто болеющим острыми респираторными вирусными заболеваниями;
- страдающим хроническими соматическими заболеваниями, в том числе болезнями и пороками развития сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, хроническими заболеваниями почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергическими заболеваниями (кроме аллергии к куриным белкам), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе ВИЧ.

2. Лицам по роду учебной или профессиональной деятельности имеющим высокий риск заболевания гриппом или заражения им других лиц:

- учащимся образовательных учреждений, студентам;
- работникам медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной и социальной сфер, полиции, военнослужащим и т.д.

✓ Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

- опыт применения гриппозных инактивированных вакцин показывает, что вакцинация женщины в период грудного вскармливания не оказывает токсического воздействия на ребенка. Окончательное решение о вакцинации беременных и кормящих грудью женщин должно приниматься врачом индивидуально с учетом риска заражения гриппом и возможных осложнений, вызванных заболеванием гриппом
- вакцинация беременных может проводиться со второго триместра беременности



Противопоказания к вакцинации Ультрикс-Квадри

- Аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами;
- Аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины;
- Сильная реакция (температура выше 40 °С, отек и гиперемия в месте введения свыше 8 см в диаметре) или осложнения на предыдущее введение гриппозных вакцин в анамнезе;
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — прививки проводят через 2–4 недели после выздоровления или в период реконвалесценции или ремиссии;
- при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры;





АО «Центравиамед» предлагает услуги по вакцинации сотрудников по предварительной записи во всех филиалах клиники и проведение выездной вакцинации на территории Заказчика



АО «Центравиамед»
e-mail: sales@aviamed.ru
г. Москва, Уланский пер., д.22,
стр.1
aviamed.ru

Подробную информацию
Вы можете узнать по телефону:
+7 (495) 607-01-51